

Coopersect vet. 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning til storfe og småfe

INDIKASJON(ER)

Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (*Ixodes ricinus*) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe, samt lus og sauekrabbe hos sau.

BIVIRKNINGER

I sjeldne tilfeller kan det forekomme utilpasshet (dårlig appetitt, muskelsitring, lett uro) i ca. 1 døgn etter behandling. Tilstanden er forbigående og ufarlig. Hvis du merker noen bivirkninger eller andre reaksjoner som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Storfe og småfe.

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Lam: 2,5 - 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Sau: 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Kalv: 5 - 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot.

Skill hårene for å få god hudkontakt

Ku: 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot.

For kontroll av flått behandles dyret hver 4.- 6. uke.

For kontroll av fluer fra 2-6 ukers intervaller.

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Kyr behandles etter kveldsmelking.

Ved innendørs behandling luftes lokalene godt.

Coopersect vet. kan brukes til drektige og diegivende dyr.

TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Storfe:

Slakt: 14 dager.

Melk: 0 dager.

Sau:

Slakt: 28 dager.

Melk: ikke tillatt brukt til lakterende sau som leverer melk til konsum.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Skal ikke oppbevares over 25 °C.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

SPESIELLE ADVARSLER

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr

Kan gi hudreaksjoner. Bruk hansker. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann. Unngå å spise, drikke og røyke samtidig med håndtering av Coopersect vet.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester kan leveres på apoteket eller ifølge lokale regler for spesialavfall. Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Coopersect vet., da preparatet er skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.